TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH, KTNN VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HƯNG YÊN
TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ PHÙ TIÊN

Số: 78 TB/TrKTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Quang Hưng, ngày 27 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Phòng trừ sâu, bệnh hại lúa mùa năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã: Quang Hưng, Đoàn Đào, Tiên Tiến, Tống Trân, Hoàng Hoa Thám, Tiên Hoa, Tiên Lữ;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp các xã;

Hiện nay, lúa mùa đang ở giai đoạn đòng già – thấp tho trỗ - trỗ bông. Theo điều tra của Trạm kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Phù Tiên: trên đồng ruộng trưởng thành (bướm) sâu cuốn lá nhỏ đang vũ hoá và đẻ trứng rộ với mật độ TB 0,5 -0,7 con/m^2, nơi cao 2-3 con/m^2, cá biệt có ruộng xanh tốt, ruộng ven làng mật độ >5 con/m^2 và tiếp tục tăng trong các ngày tới. Mật độ trứng phổ biến 15-20 quả/m^2, nơi cao 40-50 quả/m^2, cá biệt những ruộng xanh tốt, ruộng ven làng mật độ trên 100 quả/m^2. Sâu non sẽ nở rộ từ ngày 02/9 – 6/9/2026 với mật độ TB 10 - 12 con/m^2, nơi cao 30 - 40 con/m^2, cá biệt có nơi trên 100 con/m^2. Đây là lứa sâu có mật độ cao, khả năng gây hại diện rộng nếu không được phát hiện và phun trừ kịp thời sâu non sẽ gây sơ trắng lá trên diện rộng ở trà lúa giai đoạn đòng già – thấp tho trỗ.

- Sâu đục thân vũ hóa và đẻ trứng rải rắc với mật độ ổ trứng nơi cao 0,1 – 0,3 ổ/m^2. Sâu non nở và gây hại cục bộ trên các ruộng xanh tốt, gần nguồn ánh sáng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cục bộ trên các giống lúa nhiễm với mật độ TB 200- 300 con/m^2, nơi cao 500 - 700 con/m^2. Cá biệt có nơi 1000 -1500 con/m^2.

- Bệnh khô vằn gây hại trên trà lúa cấy quá dầy, bón thừa đạm ruộng xanh tốt với tỷ lệ bệnh TB 5-7 % số dảnh, nơi cao 15 -20 % số dảnh. Cá biệt có nơi trên 40% số dảnh.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn xuất hiện trên các giống lúa nhiễm như: Bắc thơm số 7, Thiên ưu 8, nếp, … với tỷ lệ TB 3 - 4 % số lá, nơi cao 7 - 9 % số lá. Đặc biệt sẽ tăng mạnh cả về diện tích và mức độ hại sau các trận mưa giông.

- Chuột gây hại rải rắc ở những diện tích xung quanh gò đống, ruộng ven làng tỷ lệ phổ biến 2-3 % số dảnh, nơi cao 5-7 % số dảnh. Cục bộ có nơi >10% số dảnh.

Để bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2026, trạm Kỹ thuật Nông Nghiệp cơ sở Phù Tiên hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ

Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ khi sâu non ở tuổi 1-2 trên các diện tích lúa chưa trỗ bông từ ngày 02/9 - 06/9/2026 bằng một trong các loại thuốc sau: Voliamtago (Vô li am ta go) 063SC, Obaone (Ô ba one) 95WG , oman (ô man) 2 WG, Incipio (In xi pi ô) 200SC, …

2. Đối với sâu đục thân 2 chấm

Được quét bằng CamScanner

Chủ động phun trừ sâu đục thân ở những ruộng lúa giai đoạn thấp tho - trỗ bông *(trỗ 3-5 % số bông)* mà có mật độ ổ trứng từ 0,2 ổ/m^2 trở lên bằng một trong các loại thuốc sau: Incipio (In ci pi ô) 200SC,Voliamtago (Vô li am ta go) 063SC, Vayego 200SC, Dupon Prevathon (Đu pông Pre va thon) 5SC, …

3. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng

Những ruộng bị rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại với mật độ cao trên (500 con/ m^2) kết hợp với thuốc sau: Difluent(đíp phờ lu) 25 WP, Chess (chét) 50 WG, Midan (Mi đan) 10WP, Kola (Ko la) 700WG, ...

4. Đối với bệnh khô vằn, lem lép hạt

Phun phòng trừ bệnh khô vằn, lem lép hạt bằng một trong các loại thuốc sau: Tyltsuper (tyl súp pe) 300 EC, Nevo (ne vô) 330EC, Evitin (E vi tin) 50SC, Callihex (Ca li hếc) 5SC, anvil 5SC, Nativo 750WWG, ...

5. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Chủ động phun phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên các giống lúa nhiễm khi bệnh chớm xuất hiện bằng thuốc: Totan (Tô tan)200WP, Xantocin (Xan tô xin) 200 WP, Sasa (Sa sa) 20WP, Starner (Sờ ta nơ) 20WP, ...

6. Đối với chuột

Hướng dẫn nông dân diệt trừ chuột hại bằng các biện pháp thủ công bằng cách đặt bẫy tại những nơi bị chuột hại cắn phá thường xuyên. Hoặc sử dụng một trong các loại thuốc sau: Cat 0,25WP, RatK 2%DP, ... nhưng phải đánh tập trung trên đồng ruộng

Lưu ý:

- Nhận được thông báo này đề nghị các địa phương chỉ đạo Phòng kinh tế, Trung tâm dịch vụ tổng hợp phối hợp với cán bộ của Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp phụ trách xã để nắm rõ hơn tình hình sâu bệnh tại địa phương, đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã để nông dân phun trừ kịp thời, đạt hiệu quả cao, không để sâu bệnh làm mất mùa.

- Các loại thuốc phòng trừ được pha với nồng độ, liều lượng như hướng dẫn trên vỏ bao bì, phun khi trời mát mẻ khô ráo. Sau phun thuốc 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại với nồng độ, liều lượng thuốc ban đầu. Vỏ bao thuốc phải được thu gom bỏ đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường./.

Nơi nhận:
- Trung tâm nước sạch, KTNN và bảo tồn thiên nhiê (Để B/c)
- Chi cục TT- BVTV (Để B/c)
- UBND các xã
- TT DV tổng hợp các xã
- Các đại lý
- Lưu trạm

TRẠM TRƯỞNG

TRẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CƠ SỞ PHÙ TIÊN

Hoàng Đình Hùng

Được quét bằng CamScanner